



RASSEMBLEMENTS DE MASSE ET ÉVÉNEMENTS

INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Aperçu

Pour réduire le risque de transmission de la COVID-19, les installations et les organisateurs de rassemblements de masse et d'événements doivent respecter la limite de 50 personnes ou moins et maintenir une distance physique de 2 mètres entre les personnes pour le moment. Mettez en œuvre des protocoles de santé et d'hygiène améliorés comme indiqué dans la section 1 sur les consignes opérationnelles générales.

Continuez de suivre de près l'évolution de la situation liée à la COVID-19 auprès de vos autorités de santé publique locales, régionales et nationales.

Qu'est-ce qu'un rassemblement de masse?

- ➔ Un rassemblement de masse est une situation ou un événement où un grand nombre de personnes peuvent être en contact étroit;
- ➔ Au nombre des exemples de rassemblements de masse figurent les événements spirituels et culturels, les spectacles, les événements sportifs, les festivals et les conférences;
- ➔ Il peut s'agir d'événements intérieurs ou extérieurs.

Quels sont les risques pour la santé publique associés aux rassemblements de masse pendant la pandémie de COVID-19?

- ➔ Les rassemblements de masse peuvent contribuer à la transmission d'agents pathogènes respiratoires, comme le virus qui cause la COVID-19;
- ➔ Les rassemblements de masse qui attirent des participants d'autres régions ou pays touchés peuvent augmenter le risque que le virus soit importé au Canada ou favoriser sa propagation au Canada.

Devrait-on modifier les plans relatifs aux rassemblements de masse pendant la pandémie de COVID-19?

- ➔ L'Agence de la santé publique du Canada recommande que les organisateurs et planificateurs d'événements annulent ou reportent les rassemblements en personne, conformément aux recommandations formulées par les autorités de santé publique locales, et qu'ils offrent des solutions de rechange virtuelles ou en ligne, dans la mesure du possible;
- ➔ Les rassemblements de masse sont tous différents, alors les décisions en matière de planification doivent être prises au cas par cas;
- ➔ L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) recommande d'utiliser le présent cadre d'évaluation des risques pour examiner systématiquement les caractéristiques du rassemblement de masse et ses participants, cerner les risques et les soupeser en fonction de leur importance dans la prise de décisions, comprendre la justification en matière de santé publique et envisager des stratégies d'atténuation des risques;
- ➔ Les répercussions sociales et économiques de l'annulation ou du report d'un rassemblement de masse doivent également être prises en compte;
- ➔ Il est possible de consulter l'autorité locale de santé publique pour obtenir d'autres conseils;
- ➔ La prise de décisions éclairées en fonction des risques en ce qui concerne les mesures de santé publique peut comprendre l'amélioration des communications avec les participants, la mise en œuvre de stratégies d'atténuation des risques et le report ou l'annulation de l'événement.

Considérations pour les réunions

- ➔ Favorisez l'enseignement en ligne et les conférences virtuelles dans la mesure du possible;
- ➔ Assurez-vous que les salles sont suffisamment grandes pour permettre une distanciation physique adéquate;
- ➔ Assurez-vous que les salles sont correctement désinfectées et ventilées;
- ➔ Les démonstrations/présentations sur le terrain/en plein air doivent permettre une distanciation adéquate.

Ressources additionnelles

- ➔ **Agence de la santé publique du Canada :** <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/rassemblement-masse-fonde-risques.html>
- ➔ **Organisation mondiale de la santé :** Key Planning Recommendations for Mass Gatherings in the context of the current COVID-19 outbreak. Feb 14 2020. Accessible à l'adresse: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331004/WHO-2019-nCoV-POEmassgathering-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (en anglais seulement)
- ➔ **United States Centers for Disease Control and Prevention:** Get Your Mass Gatherings or Large Community Events Ready for Coronavirus Disease 2019. Mar 3, 2020. Accessible à l'adresse : <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html> (en anglais seulement)

Cadre d'évaluation des risques : Population participant à l'événement

Combien de personnes sont attendues à l'événement?

Importance élevée

Justification en matière de santé publique : The larger the number of participants, the greater the likelihood of a participant being a case of COVID-19. Large numbers of people may also create greater likelihood of crowding and close contact.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Réduire le nombre de participants ou changer le lieu de l'événement pour éviter l'entassement.

Y aura-t-il des participants provenant des régions touchées, où la COVID-19 a été détectée?

Importance élevée

Justification en matière de santé publique : Si l'on attend des participants des régions touchées, le risque d'importation de la maladie est plus élevé. Ces voyageurs peuvent surveiller eux-mêmes les symptômes de la COVID-19 ou se pla-cer en isolement volontaire pendant 14 jours après leur arrivée au Canada, en fonction des con-seils de santé publique qui leur sont fournis à leur arrivée au pays.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Planifier la mise en commun de l'information, la communication des risques et les communications urgentes;
- ➔ Communiquer des stratégies de prévention personnelle : rester à la maison en cas de maladie, respecter les mesures d'hygiène des mains et d'hygiène respiratoire; éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche lorsque les mains ne sont pas lavées;
- ➔ Tenir compte de l'accessibilité des communications (p. ex. dans de multiples langues et en langage simple).
- ➔ Établir des politiques de remboursement souples pour permettre aux participants de rester à la maison en cas de maladie;
- ➔ Tenir compte des facteurs de risque du personnel et des bénévoles et envisager de recourir à la réaffectation pour protéger les travailleurs;
- ➔ Prévoir l'absence du personnel et des bénévoles.

Les participants ou le personnel/les bénévoles de l'événement appartiennent-ils à des groupes démographiques plus susceptibles de développer une maladie grave, comme les personnes âgées ou les personnes ayant des problèmes de santé sous jacents?

Importance élevée

Justification en matière de santé publique : Étant donné que les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques ou entraînant une immunodépression sont plus susceptibles d'être gravement atteintes par la maladie, il faut songer à les protéger contre une éventuelle exposition à des cas de COVID-19. Il s'agit d'insister sur la communication des risques à ces participants.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Plan for information sharing, risk communication, and emergency communications
- ➔ Communicate personal preventive strategies: stay home if ill, practice hand hygiene and respiratory etiquette, avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands
- ➔ Consider accessibility of communications (e.g. multiple languages, plain language)
- ➔ Develop flexible refund policies for participants to promote staying home when sick
- ➔ Consider risk factors of staff/volunteers and reassignment to protect workers
- ➔ Plan for staff/volunteer absences

Les personnes qui assistent à l'événement jouent-elles un rôle au sein d'infrastructures essentielles, p. ex. les travailleurs de la santé?

Importance élevée

Justification en matière de santé publique : En cas de transmission lors du rassemblement de masse, les participants pourraient contracter la maladie ou devoir s'isoler par précaution. L'absentéisme qui en résulterait pourrait compromettre le fonctionnement normal d'industries essentielles et la prestation de services essentiels

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Planifier la mise en commun de l'information, la communication des risques et les communications urgentes;
- ➔ Communiquer des stratégies de prévention personnelle : rester à la maison en cas de maladie, respecter les mesures d'hygiène des mains et d'hygiène respiratoire; éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche lorsque les mains ne sont pas lavées;

- ➔ Tenir compte de l'accessibilité des communications (p. ex. dans de multiples langues et en langage simple).
- ➔ Établir des politiques de remboursement souples pour permettre aux participants de rester à la maison en cas de maladie;
- ➔ Tenir compte des facteurs de risque du personnel et des bénévoles et envisager de recourir à la réaffectation pour protéger les travailleurs;
- ➔ Prévoir l'absence du personnel et des bénévoles.

Les personnes qui assistent à l'événement sont-elles membres d'un groupe professionnel qui pourrait présenter un risque accru d'infection?

Importance moyenne

Justification en matière de santé publique : Les travailleurs de la santé peuvent présenter un plus grand risque d'infection et, par conséquent, risquent davantage de transmettre la maladie aux autres parce qu'il est possible qu'ils soient exposés à des cas de COVID-19 en milieu professionnel. Les participants qui travaillent en contact étroit avec des voyageurs arrivant de l'étranger peuvent également présenter un risque accru d'infection.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Planifier la mise en commun de l'information, la communication des risques et les communications urgentes;
- ➔ Communiquer des stratégies de prévention personnelle : rester à la maison en cas de maladie, respecter les mesures d'hygiène des mains et d'hygiène respiratoire; éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche lorsque les mains ne sont pas lavées;
- ➔ Tenir compte de l'accessibilité des communications (p. ex. dans de multiples langues et en langage simple).
- ➔ Établir des politiques de remboursement souples pour permettre aux participants de rester à la maison en cas de maladie;
- ➔ Tenir compte des facteurs de risque du personnel et des bénévoles et envisager de recourir à la réaffectation pour protéger les travailleurs;
- ➔ Prévoir l'absence du personnel et des bénévoles.

Certaines personnes qui participent à l'événement risquent-elles davantage de propager la maladie, p. ex. les jeunes enfants?

Importance moyenne

Justification en matière de santé publique : Les jeunes enfants risquent davantage d'augmenter la propagation de la maladie parce qu'ils sont généralement moins enclins à observer des pratiques efficaces d'hygiène des mains et à appliquer les mesures d'hygiène respiratoire, et qu'ils ont tendance à adopter des comportements qui favorisent la transmission dans leurs relations avec les autres. Il faut donc songer à prévenir que les enfants propagent la COVID-19.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Planifier la mise en commun de l'information, la communication des risques et les communications urgentes;
- ➔ Communiquer des stratégies de prévention personnelle : rester à la maison en cas de maladie, respecter les mesures d'hygiène des mains et d'hygiène respiratoire; éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche lorsque les mains ne sont pas lavées;
- ➔ Tenir compte de l'accessibilité des communications (p. ex. dans de multiples langues et en langage simple).
- ➔ Établir des politiques de remboursement souples pour permettre aux participants de rester à la maison en cas de maladie;
- ➔ Tenir compte des facteurs de risque du personnel et des bénévoles et envisager de recourir à la réaffectation pour protéger les travailleurs;
- ➔ Prévoir l'absence du personnel et des bénévoles.

Les participants proviennent-ils de régions où les ressources du système de santé sont limitées (p. ex. des communautés éloignées et isolées)?

Importance moyenne

Justification en matière de santé publique : Les participants à l'événement qui retournent dans des communautés où les ressources du système de santé sont limitées peuvent introduire le virus dans des communautés qui disposent d'une capacité moindre à contenir et à atténuer la propagation du virus.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Planifier la mise en commun de l'information, la communication des risques et les communications urgentes;

- ➔ Communiquer des stratégies de prévention personnelle : rester à la maison en cas de maladie, respecter les mesures d'hygiène des mains et d'hygiène respiratoire; éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche lorsque les mains ne sont pas lavées;
- ➔ Tenir compte de l'accessibilité des communications (p. ex. dans de multiples langues et en langage simple).
- ➔ Établir des politiques de remboursement souples pour permettre aux participants de rester à la maison en cas de maladie;
- ➔ Tenir compte des facteurs de risque du personnel et des bénévoles et envisager de recourir à la réaffectation pour protéger les travailleurs;
- ➔ Prévoir l'absence du personnel et des bénévoles.

Les participants sont-ils tous inscrits, et ont-ils fourni leurs coordonnées?

Importance moyenne

Justification en matière de santé publique : Dans l'éventualité d'une écloison associée à l'événement, les coordonnées des participants pourraient être demandées par les autorités de santé publique pour assurer un suivi et effectuer la recherche des contacts.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Conserver les coordonnées des participants.

Cadre d'évaluation des risques : Données démographiques et épidémiologiques locales

La COVID-19 sévit-elle au sein de la communauté locale?

Importance élevée

Justification en matière de santé publique : Si l'on observe une transmission au sein de la communauté locale, les participants au rassemblement de masse pourraient être infectés. Dans une région touchée, d'autres services destinés aux participants peuvent fonctionner à capacité limitée (p. ex. les restaurants, les hôtels).

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Mobiliser les partenaires pertinents, notamment les autorités locales de santé publique.

La population locale présente-t-elle un risque élevé d'être gravement atteinte par la COVID-19 si elle se propage?

Importance moyenne

Justification en matière de santé publique : Certaines communautés pourraient vouloir réduire leur risque d'importation de la COVID-19 en raison des caractéristiques locales, p. ex. si elles comptent de nombreux résidents âgés ou si elles affichent des taux particulièrement élevés de maladies chroniques.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Mobiliser les partenaires pertinents, notamment les autorités locales de santé publique.

Cadre d'évaluation des risques : Activités de l'événement

Les participants se livre-ront-ils à des activités qui favorisent la transmission?

Importance élevée

Justification en matière de santé publique : Activités qui pourraient contribuer à la propagation : salutations (poignées de main, étreintes, bises), chants, applaudissements et acclamations, contact physique étroit (sports de contact), partage de tasses, d'assiettes, d'ustensiles, etc.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Proposer des activités virtuelles ou diffusées en direct;
- ➔ Fournir des rafraîchissements emballés au lieu d'un buffet.

Cadre d'évaluation des risques : Entassement

Les participants seront-ils toujours à moins de deux mètres les uns des autres?

Importance élevée

Justification en matière de santé publique : Les gouttelettes respiratoires ont tendance à s'éparpiller à moins de deux mètres de leur source. Ainsi, le maintien d'une distance de deux mètres par rapport aux autres est une précaution pour prévenir la propagation.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Changer le lieu de l'événement pour éviter l'entassement.

L'événement se tiendra-t-il à l'intérieur, à l'extérieur ou les deux?

Importance moyenne

Justification en matière de santé publique : Les événements tenus à l'extérieur peuvent présenter un risque de transmission plus faible des maladies respiratoires que ceux tenus à l'intérieur en raison d'une meilleure ventilation.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Envisager de tenir l'événement à l'extérieur ou d'augmenter la ventilation en ouvrant les fenêtres et les portes (si le temps le permet).

La présence de points d'entrée et de sortie restreints obligera-t-elle les participants à être très proches les uns des autres ou à passer par des lieux achalandés dont les surfaces sont touchées par de nombreuses personnes (p. ex. portes et ascenseurs)?

Importance moyenne

Justification en matière de santé publique : L'engorgement et les files d'attente créant un engorgement font courir aux participants un risque accru d'être exposés à des gouttelettes respiratoires. Les surfaces qui sont touchées par de nombreuses personnes peuvent être contaminées, ce qui augmente le risque de transmission.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Échelonner les arrivées et les départs.
- ➔ Accroître la fréquence de nettoyage de l'environnement et accorder une attention particulière aux surfaces touchées par de nombreuses personnes.

Cadre d'évaluation des risques : Durée de l'événement

Combien de temps les participants se-ront-ils réunis à l'événement?

Importance moyenne

Justification en matière de santé publique : Plus la durée de l'événement est longue, plus il y a risque de transmission. Il faut également réfléchir à la façon dont le fait d'offrir un hébergement pourrait avoir des répercussions sur l'entassement, la proximité et le genre et la durée des contacts.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Réduire la durée de l'événement ou échelonner l'horaire pour limiter le nombre de participants présents au même moment.

Cadre d'évaluation des risques : Ressources de l'événement

Des postes d'hygiène des mains seront-ils accessibles partout sur les lieux?

Importance moyenne

Justification en matière de santé publique : L'hygiène des mains sera plus fréquente si des désinfectants à mains à base d'alcool ou des lavabos avec du savon et des serviettes jetables sont facilement accessibles.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Faciliter l'accès aux postes de lavage des mains.

Les lieux de l'événement peuvent-ils être configurés de façon à réduire la proximité des participants?

Importance moyenne

Justification en matière de santé publique : Les gouttelettes respiratoires ont tendance à s'éparpiller à moins de deux mètres de leur source. Ainsi, le maintien d'une distance de deux mètres par rapport aux autres est une précaution pour prévenir la propagation.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Configurer les lieux de l'événement pour favoriser le maintien d'une distance de deux mètres entre les participants.
- ➔ Prévoir un endroit pouvant être utilisé pour isoler les participants ou les travailleurs malades.

Les surfaces touchées par de nombreuses personnes seront-elles nettoyées et désinfectées fréquemment pendant l'événement?

Importance moyenne

Justification en matière de santé publique : Les surfaces touchées par de nombreuses personnes peuvent être contaminées, ce qui augmente le risque de transmission. Le virus du SRAS-CoV-2 peut vivre sur des surfaces pendant une période allant de quelques heures à quelques jours. Il peut être tué à l'aide de désinfectants achetés en magasin (lien vers la fiche d'information sur le nettoyage de l'environnement).

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Accroître la fréquence de nettoyage de l'environnement et accorder une attention particulière aux surfaces touchées par de nombreuses personnes. Utiliser un produit qui nettoie et qui désinfecte;
- ➔ Prévoir un nombre suffisant d'employés pour assurer le maintien des stratégies de prévention, comme les postes de lavage des mains ainsi que le nettoyage et la désinfection.

Des professionnels de la santé ou des premiers intervenants seront-ils présents à l'événement pour assurer le dépistage et offrir des soins à toute personne qui semble présenter des symptômes?

Faible importance

Justification en matière de santé publique : Bien que le dépistage ne puisse pas nécessairement identifier tous les participants atteints de la COVID-19, les professionnels de la santé peuvent être en mesure de distinguer rapidement les personnes symptomatiques des autres participants et de les isoler sans tarder. Les professionnels de la santé doivent connaître les protocoles appropriés en ce qui a trait à l'équipement de protection individuelle et aux mesures de prévention et de contrôle des infections.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Envisager la possibilité que des professionnels de la santé soient présents pour effectuer le dépistage ou s'occuper des personnes présentant des symptômes;
- ➔ S'assurer de disposer du matériel nécessaire pour la prévention et d'offrir une formation au personnel et aux bénévoles sur la façon de l'utiliser (p. ex. équipement de protection individuelle);
- ➔ Si possible, fournir des masques médicaux jetables qui seront utilisés si un travailleur ou un participant tombe malade au cours de l'événement.

Cadre d'évaluation des risques : Capacité du système de santé

Le système de santé local a-t-il la capacité voulue pour évaluer, tester et soigner les personnes que l'on soupçonne être infectées par la COVID 19, ces personnes pouvant être assez nombreuses?

Importance élevée

Justification en matière de santé publique : Les personnes faisant l'objet d'une enquête et les cas de COVID-19 pourraient représenter un fardeau important pour le système de santé local si bon nombre d'entre elles ont besoin de tests et de soins en peu de temps.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Communiquer comment se fera l'accès aux soins de santé à cet endroit, notamment la nécessité de téléphoner avant de se présenter pour prévenir l'exposition des personnes présentes dans le milieu de soins.

Cadre d'évaluation des risques : Emplacement géographique

Le lieu de l'événement est-il éloigné géographiquement ou à proximité d'une région densément peuplée?

Importance moyenne

Justification en matière de santé publique : L'éloignement géographique peut limiter l'accès aux soins tertiaires et compliquer le rapatriement d'une personne touchée. Toutefois, la proximité d'une région densément peuplée pourrait accélérer la propagation de la maladie.

Stratégies d'atténuation des risques :

- ➔ Mobiliser les partenaires pertinents, notamment les autorités locales de santé publique et les services médicaux d'urgence.